

## TASECTAN®

Tasectan® is een medisch hulpmiddel dat dient om de fysiologische functies van de darmwand te herstellen en dat speciaal werd ontwikkeld om de symptomen van diarree van uiteenlopende oorsprong, zoals een opgezet buik en frequente ontlasting, onder controle te houden en te verminderen. Doeltreffend binnen 12 uur.

Gelatinetannaat, het bestanddeel van dit product, ondergaat geen wijzigingen in de maag en vormt een laagje dat het darmslijmvlies beschermt en zo de frequentie en de duur van de diarreeverschijnselen vermindert. Dit medisch hulpmiddel is verkrijgbaar als capsules voor volwassenen en als poeder voor kinderen.

### Verpakking

20 zakjes van 250 mg (voor gebruik bij kinderen).

Blisterverpakking met 15 capsules van 500 mg.

### Samenstelling

Capsules: gelatinetannaat, maïszetmeel, magnesiumstearaat

Poeder: gelatinetannaat

### Gebruik

Capsules: de capsule inslikken met water.

Poeder: kan gemengd worden met voedsel of met een beetje melk, fruitsap of water. Goed mengen en onmiddellijk innemen.

### Dosering

**Volwassenen:** 1 à 2 capsules om de 4 tot 6 uur totdat de symptomen verdwenen zijn.

**Kinderen jonger dan 3 jaar:** 1 zakje om de 6 uur totdat de symptomen verdwenen zijn.

**Kinderen van 3 tot 14 jaar:** 1 à 2 zakjes om de 6 uur totdat de symptomen verdwenen zijn.

### Voorzorgen

Houd rekening met de volgende waarschuwingen:

- Het is niet nodig een arts te raadplegen voordat u dit product gaat gebruiken. Het wordt echter aangeraden om dit wel te doen indien de symptomen ernstig zijn of aanhouden of indien er twijfel is over de diagnose, zeker bij kinderen jonger dan 3 jaar en bij ouderen.
- In geval van diarree bij kinderen jonger dan 3 jaar, wordt u aangeraden contact op te nemen met uw arts, vooral als er ook andere symptomen aanwezig zijn.
- Het is aan te raden om een grote hoeveelheid vocht in te nemen en de gebruikelijke dieetmaatregelen bij de behandeling van diarree in acht te nemen (orale rehydratie).
- Hoewel geen bijwerkingen werden waargenomen, wordt afgeraden dit medisch hulpmiddel tijdens de zwangerschap of tijdens de eerste maanden van de borstvoeding te gebruiken. Raadpleeg altijd eerst uw arts.
- Gebruik dit product niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.
- Gebruik het product niet als de blister of het zakje open of beschadigd is.
- Bewaar bij kamertemperatuur en verwijderd van elke warmtebron. Niet in de vriezer bewaren.
- Houd buiten het bereik van kinderen.

### Contra-indicaties en bijwerkingen

Tasectan® niet gebruiken in geval van allergie voor gelatinetannaat of voor een van de andere stoffen in dit product.

### Verdeler

THERABEL PHARMA N.V.

E. Van Ophemstraat 108

B-1180 Brussel



NOVINTETHICAL PHARMA SAGL  
Via Pian Scairolo, 11  
6915 – Lugano (Zwitserland)

