

Novalac met à votre disposition une gamme complète de laits infantiles. Les laits **Novalac** sont élaborés selon des critères de très haute qualité.

AVIS IMPORTANT

Le lait maternel est l'aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne alimentation maternelle est essentielle pour la mise en route et le maintien de l'allaitement. **Novalac NovaRice** peut être utilisé comme seule source d'alimentation jusqu'à l'âge de 6 mois, si l'enfant n'est pas allaité. Au-delà de 6 mois et selon avis médical **Novalac NovaRice** s'intégrera à l'alimentation diversifiée de votre enfant. A n'utiliser que sous contrôle médical. Il n'y a pas d'avantage particulier à donner **Novalac NovaRice** aux nourrissons qui ne souffrent pas d'inconforts pour lesquels le produit est prévu. Ne changez pas ce lait sans avis médical. Ce produit n'est pas destiné à une alimentation par sonde. Ce produit ne peut pas être administré par voie parentérale.

INDICATIONS

Novalac NovaRice est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour nourrissons à utiliser en cas d'allergies aux protéines de lait de vache et/ou une intolérance au lactose. **Novalac NovaRice** contient des protéines hydrolysées de riz et de ce fait est adapté aux régimes spéciaux qui excluent les protéines de lait de vache et/ou lactose. **Novalac NovaRice** ne contient pas de lactose, ni de gluten. Il faut toujours suivre l'avis du médecin concernant le sevrage. N'ajoutez pas des produits contenant des protéines de lait dans l'alimentation de l'enfant sans l'avis de votre médecin. Ce produit ne doit pas être donné en cas de malabsorption du glucose-galactose. Si votre enfant est né prématurément, s'il a un faible poids ou s'il est immunodéprimé, sollicitez impérativement l'avis de votre médecin.

TABLEAU INDICATIF D'ALIMENTATION

Age (mois)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36	Leef tijd (maanden)
Nombre de biberons par jour	6	5	5	4	3*	2*-3*	Aantal flesjes per dag
Nombre de mesurètes	3	4	5	7	7	8	Aantal maatjes
Eau bouillie (ml)	90	120	150	210	210	240	Gekookt water (ml)

* au sein d'une alimentation diversifiée.

Reconstitution: 13.2 %, 1 mesurette arasée et non tassée (4,4g) pour 30 ml d'eau. Utiliser exclusivement la mesurette incluse dans la boîte.

Avec l'accord de votre médecin, le nombre de repas doit être adapté aux besoins de votre enfant.

CONSEILS D'UTILISATION

- A consommer de préférence avant la date indiquée sous la boîte (EXP).
- Retirer complètement l'opercule métallique lors de la 1^{re} utilisation.
- Après ouverture, utiliser dans les 3 semaines.
- Bien refermer la boîte après chaque utilisation avec le couvercle en plastique.
- Conserver la boîte dans un endroit propre, sec et frais, à l'abri de la lumière et de contaminations.
- Ne pas ajouter de sucre.
- Le biberon ne doit pas remplacer les tétines. Nettoyez les dents de votre bébé après le dernier biberon du soir.
- Ne pas préparer le biberon à l'avance, mais toujours juste avant la consommation. Tout biberon doit être consommé dans l'heure qui suit sa préparation. Jeter sans hésiter le reste d'un biberon non terminé.

Novalac staat voor een uitgebreid gamma baby melken. **Novalac** wordt geproduceerd met respect voor zeer hoge kwaliteitscriteria.

BELANGRIJK

Moeder melk is de ideale voeding voor de zuigeling. Een goede voeding van de moeder is essentieel voor het starten en voortzetten van borstvoeding. **Novalac NovaRice** kan dienen als enige voedingsbron vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 maanden, indien geen borstvoeding wordt gegeven. Vanaf 6 maanden en volgens medisch advies, kan **Novalac NovaRice** deel uitmaken van een gevarieerd dieet. Enkel gebruiken onder medisch advies. Zuigelingen zonder de ongemakken waarvoor **Novalac NovaRice** bestemd is, hebben geen extra voordeel bij het drinken ervan. Schakel niet over op andere melk zonder medisch advies. Dit product is niet geschikt voor sondevoeding. Dit product is niet bestemd voor parenteraal gebruik.

INDICATIES

Novalac NovaRice is een voeding voor medisch gebruik bij zuigelingen en kinderen met koemelkeiwitalergie en/of lactose intolerantie. **Novalac NovaRice** bevat gehydrolyseerde rijstproteïnen en is daardoor geschikt voor speciale diëten die koemelkeiwitten en/of lactose uitsluiten. **Novalac NovaRice** is lactosevrij en glutenvrij. Volg steeds de raad van uw arts in verband met het spenen. Voeg aan het dieet van uw kind geen producten toe die melkeiwitten bevatten zonder uw arts te raadplegen. Dit product mag niet toegediend worden aan zuigelingen in geval van glucose-galactosemalabsorptie. Indien uw kind prematuur werd geboren, een laag gewicht heeft of immunitaire problemen heeft, volg dan nauwgezet de raadgevingen van uw arts.

VOEDINGSSCHEMA

Age (mois)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36	Leef tijd (maanden)
Nombre de biberons par jour	6	5	5	4	3*	2*-3*	Aantal flesjes per dag
Nombre de mesurètes	3	4	5	7	7	8	Aantal maatjes
Eau bouillie (ml)	90	120	150	210	210	240	Gekookt water (ml)

* als deel van een gevarieerd dieet.

Samenstelling: 13.2%, 1 afgestreken en niet aangedrukt maatje (4,4g) per 30 ml water. Gebruikt uitsluitend de meegeleverde maatlepel.

In samenspraak met uw arts kan het aantal maaltijden worden aangepast aan de behoeften van uw kind.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven onderaan de doos (EXP).
- Verwijder de metalen folie volledig bij opening.
- Gebruik de inhoud binnen de 3 weken na opening.
- Sluit de doos na elk gebruik goed met het plastic deksel.
- Bewaar de doos op een propere, droge en koele plaats, beschermd tegen licht en contaminatie.
- Voeg geen suiker toe.
- De papfles mag de fopspeen niet vervangen. Reinig de tanden van je baby na de laatste avondvoeding.
- Bereid de zuigfles niet op voorhand maar steeds net voor de voeding. Een zuigfles moet binnen het uur ná de bereiding gebruikt worden. Niet zonder aarzelen de restjes van een niet volledig uitgedronken zuigfles onmiddellijk weg.



20J0A25B 2002895//FLT4012#1/005

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

Novalac NovaRice

Babyvoeding op basis van
gehydrolyseerde rijstproteïnen

Alimentation pour bébé à base
de protéines de riz hydrolysées



Voeding voor medisch gebruik bij koemelkeiwitalergie en lactose intolerantie

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales en cas
d'allergie aux protéines de lait de vache et d'intolérance au lactose

De
Van 0 tot 36
maand

800g e

Novalac NovaRice

Service Consommateurs/Consumentendienst

Appel gratuit : 0800 14 015
Gratis oproep



Préparation/Bereiding

LAVEZ-VOUS TOUJOURS LES MAINS ET LA SURFACE DE TRAVAIL AVANT DE PREPARER LES BIBERONS. / WAS ALTUD DE HANDEN EN HET WERKOPPERVLAK VOOR U EEN FLESJE MAAKT.

1. Nettoyez puis stérilisez le biberon et ses accessoires (eau bouillante pendant 10 minutes ou autre système approprié).
2. Utilisez de l'eau potable pure bouillie pendant 5 minutes puis tiédie jusque 40°C, ou chauffez une eau minérale adaptée aux nourrissons jusque 40°C.
3. Ajoutez d'abord la quantité d'eau nécessaire dans le biberon.
4. Ajoutez le nombre nécessaire de mesurètes arasées et non tassées (utilisez exclusivement la mesurette incluse dans la boîte).
5. Fermez le biberon avec le capuchon en plastique. Roulez le biberon entre vos mains.
6. Agitez bien jusqu'à ce que la poudre soit totalement dissoute et sans grumeaux. Remplacez le capuchon par une tétine stérilisée.
7. Contrôlez la température (37°C) sur la face interne de l'avant-bras. Utilisez immédiatement.

La mauvaise préparation et conservation de ce produit peuvent entraîner des risques pour la santé de votre enfant. / Aan een onjuiste bereiding en/of bewaring van het product zijn gezondheidsrisico's verbonden.

En raison de sa composition particulière, **Novalac NovaRice** a un goût et une odeur spécifiques qui peuvent différer d'un lait classique pour nourrissons. Ceci peut conduire à l'apparition de selles verdâtres et/ou moins dures, sans aucun inconvénient pour l'enfant.

Novalac NovaRice contient des ingrédients caractérisés par un temps de réhydratation et une densité particulières. Ceci peut être résolu en agitant de nouveau. / Door zijn bijzondere samenstelling heeft **Novalac NovaRice** een specifieke smaak en geur, die kan verschillen van een standaard zuigelingenmelk. Dit kan leiden tot zachtere en/of groenachtige stoelgang, zonder verdere ongemakken voor het kind. **Novalac NovaRice** bevat ingrediënten met een specifieke rehydratatie tijd en dichtheid, waardoor er twee lagen kunnen verschijnen enkele minuten na de bereiding. Dit kan opgelost worden door de fles opnieuw te schudden.

Un produit de/een product van: Laboratoires Novalac SA - GENÈVE
Distribution et information médicale/Distributie en medische informatie:
Menarini Benelux N.V./S.A., De Kleitlaan 3, B-1831 Machelen

		Pour/per 100ml	Pour/per 100g	
Energie kJ/Kcal		277/66	2100/502	Energie kJ/Kcal
Matières grasses dont:	g	3,3	25	Vetten, waarvan:
Acides gras saturés	g	1,3	9,9	Verzadigde vetzuren
Ac. linoléique	mg	0,6	4,3	Linolzuur
Ac. α-linolénique	mg	55	420	α-linoleenzuur
DHA (Acide docosahexaénoïque)	mg	16	120	DHA (Docosahexaëenzuur)
ARA (Acide arachidonique)	mg	16	30	ARA (Arachidonzuur)
Glucides	g	7,3	55,6	Koolhydraten
Sucres	g	0,5	3,8	Suikers
Equivalent protéique*	g	1,8	13,4	Eiwit equivalent*
Sel	g	0,08	0,575	Zout
Vitamines				Vitaminen
Vitamine A	µg	58	440	Vitamine A
Vitamine D	µg	1,6	12	Vitamine D
Vitamine E	mg	1,1	8,7	Vitamine E
Vitamine K	µg	4	30	Vitamine K
Vitamine C	mg	7,9	60	Vitamine C
Thiamine	mg	0,11	0,8	Thiamine
Riboflavine	mg	0,2	1,2	Riboflavine
Niacine	mg	0,6	4,5	Niacine
Vitamine B6	mg	0,08	0,6	Vitamine B6
Acide folique	µg	11	80	Foliumzuur
Folates	µg-EFA	18	135	Folaten
Vitamine B12	µg	0,2	1,5	Vitamine B12
Biotine	µg	2	15	Biotine
Acide pantothénique	mg	0,7	5	Pantotheenzuur
Minéraux				Mineralen
Sodium	mg	30	230	Natrium
Potassium	mg	73	550	Kalium
Chlorure	mg	53	400	Chloor
Calcium	mg	59	450	Calcium
Phosphore	mg	40	300	Fosfor
Magnésium	mg	5,9	45	Magnesium
Fer	mg	1	7,8	Ijzer
Zinc	mg	0,4	3,3	Zink
Cuivre	mg	0,05	0,38	Koper
Manganèse	mg	0,005	0,04	Mangaan
Fluore	µg	<0,06	<0,45	Fluor
Sélénium	µg	2,9	22	Seleen
Chrome	µg	<5,9	<45	Chroom
Molybdène	µg	<5,9	<45	Molybdeen
Iode	µg	13	100	Jood
Choline	mg	22	170	Choline
Inositol	mg	3,3	25	Inositol
Taurine	mg	5,3	40	Taurine
L-carnitine	mg	1,1	8	L-carnitine
Nucléotides	mg	2,5	18,6	Nucleotiden

* La source de protéines est un hydrolysat de protéines de riz. / * De oorsprong van de eiwitten is een hydrolysaat van rijstewit.



PMS 355 C

PMS 288 C

M Y

Litho:
17333727
Operator: MM