

Merk	Urilys-Forte® CE klasse IIa
IFU	Urilys-Forte® Medisch hulpmiddel CE 0481 2 g D-Mannose Blaasontsteking - Helpt bij de behandeling van een blaasontsteking of urineweginfectie (veroorzaakt door E. coli) - Ter preventie van terugkerende blaasontstekingen of urineweginfecties (veroorzaakt door E. coli) Advies Lees de bijsluiter aandachtig voordat je Urilys-Forte inneemt, zelfs wanneer je dit medisch hulpmiddel al eerder hebt ingenomen. Voor een optimaal resultaat moet de inname van Urilys-Forte gebeuren zoals beschreven in de bijsluiter. Bewaar de bijsluiter in geval je deze opnieuw wilt inzien. Indicaties Urilys-Forte helpt bij de behandeling en preventie van een blaasontsteking of terugkerende urineweginfecties veroorzaakt door E. coli. Een bacteriële urineweginfectie of blaasontsteking ontstaat meestal doordat bacteriën vanuit de darm via de urinebuis in de urinewegen terecht komen. Daar hechten ze zich aan de blaaswand of andere delen van de urinewegen en veroorzaken ze een infectie. Een urineweginfectie kan gepaard gaan met één of meerdere symptomen: - Een brandend of pijnlijk gevoel tijdens het plassen - Drang om te plassen - Frequent moeten plassen - Pijn in de onderbuik Werkingsmechanisme Urilys-Forte Het actieve bestanddeel van Urilys-Forte is D-Mannose. D-Mannose komt van nature, in kleine hoeveelheden, voor in het menselijk lichaam. D-Mannose hecht zich vast aan de E. coli bacteriën en zorgt er zo voor dat de bacteriën zich niet kunnen vasthechten aan de wanden van de urinewegen. De bacteriën worden vervolgens eenvoudig uit het de blaas verwijderd via de urine tijdens het plassen.

Dosering en gebruik

Urilys-Forte is aangewezen voor volwassenen vanaf 18 jaar:

- Ter ondersteuning van de behandeling van een blaasontsteking: 1 bruistablet 2x per dag
- Bij de preventie van een terugkerende blaasontsteking: 1 bruistablet per dag

Los de bruistablet op in een glas water (200ml) en roer goed. Drink de oplossing onmiddellijk op. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Vraag raad aan je arts of apotheker.

Het is aangeraden om dagelijks minstens 2 liter water te drinken om het plassen te vergemakkelijken.

Gebruiksduur:

Gebruik Urilys-Forte niet langer dan 30 achtereenvolgende dagen. Na 4 dagen onderbreking kan de inname worden hervat.

Naast het medisch hulpmiddel **Urilys-Forte** bestaat ook het voedingssupplement **Urilys-Comfort** op basis van veenbessen- en guldenroede extract dat gedurende een langere periode kan ingenomen worden. Vraag raad aan je arts of apotheker.

Bijwerkingen:

Urilys-Forte wordt goed verdragen en kent weinig bijwerkingen. Diarree kan een bijwerking zijn, maar dit is heel zeldzaam.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding:

Er is niet voldoende informatie beschikbaar over het gebruik van Urilys-Forte tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Raadpleeg je arts of apotheker voor inname.

<warning symbol> Waarschuwing:

- Niet gebruiken bij overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen
- Bij overdosering kunnen er klachten ontstaan zoals winderigheid, maagpijn of diarree
- Buiten het bereik van jonge kinderen houden
- Als je een allergische reactie ervaart, stop dan het gebruik van Urilys-Forte

Raadpleeg je arts of apotheker wanneer:

- er zich bloed in je urine bevindt
- de symptomen verergeren
- je na 3 dagen gebruik van Urilys-Forte geen merkbare verbetering van de symptomen hebt waargenomen

- je een onderliggende medische aandoening hebt of medicatie neemt
- je symptomen hebt zoals 38°C koorts of hoger, rillingen, misselijkheid, braken of diarree. Je hebt dan mogelijk een infectie van de bovenste urinewegen, waarvoor een aanvullende behandeling nodig is.
- je in het verleden last hebt gehad van nierstenen

Samenstelling:

Citroenzuur, 2g D-Mannose, Natriumwaterstofcarbonaat, Maïszetmeel, Rode bietenpoeder, Sorbitol, Wilde bessen extract, Inuline, Sucralose

Bevat 2 g D-Mannose per bruistablet.

Natuurlijk bessenaroma

Bevat geen allergenen en is geschikt voor veganisten.

Inhoud:

14 bruistabletten

<storage temperature symbol (5-25 °C) >

Bewaring:

Bij kamertemperatuur (5-25°C) bewaren op een donkere, droge plaats in de originele verpakking. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

<best before symbol> Vervaldatum

Zie verpakking. Niet gebruiken na deze datum.

Medisch hulpmiddel

Urilyl-Forte is een medisch hulpmiddel klasse IIa in overeenkomst met de Europese richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen.

Datum waarop deze instructies voor het laatst werden herzien:
Maart 2021 • 073088 -V1.2

Urilyl-Forte is een handelsmerk van EG en wordt geproduceerd onder licentie van PK.

<manufacturer symbol>PK Benelux BV

Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

CE 0481

Verdeler

EG nv/sa

Heizel Esplanade b22, 1020 Brussel, BE

www.urilys.be

