

PRANARÔM		Gamme DIGESTAROM
		Produit : DIGEST CONFORT
FICHE TECHNIQUE		
Version	V1	

DESCRIPTION :

Catégorie réglementaire (CA – COS – Chim) : CA

Liste des ingrédients : pour 6 comprimés : Agent de charge : Sorbitol; Cichorium intybus extract 0,30 g (chicorée) ; Arôme : citron; Anti-agglomérants : dioxyde de silice, Sels de Magnésium d'acides gras ; Huiles essentielles : Mentha x piperita 45 mg (Menthe poivrée), Citrus limonum 45 mg (Citron), Illicium verum 45 mg (Anis étoilé), Zingiber officinale 29 mg (Gingembre), Citrus reticulata 29 mg (Mandarine), Carum carvi 27 mg (Carvi) ; Edulcorant : sucralose ; Huile essentielle Cinnamomum cassia 5 mg (Cannelier de Chine).

Bio : oui, pour les huiles essentielles – non pour le produit fini

DLUO / PAO : 3 ans

Conditionnement : Etui cartonné contenant 3 blisters de 7 comprimés à croquer ou à sucer

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES :

Aspect : Pastille à croquer ou à sucer

Couleur : blanchâtre, avec des petits points foncés (poudre de chicorée)

Odeur / goût : très aromatique, frais, mentholé et anisé

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

pH (20°C) : N/A

Densité (20°C) : N/A

Indice de Brix : N/A

.....

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES :

..... (Selon le certificat d'analyse, défini dans le cahier des charges)

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE CONSERVATION :

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose conseillée. Ne pas utiliser plus de 14 jours. Conserver à l'abri de toute source de chaleur et de la lumière. Ce produit n'est pas un médicament. Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement et chez l'enfant de moins de 12 ans. Demander conseil à un professionnel de la santé, particulièrement en cas de prise concomitante d'anti-coagulants et d'anti-agrégants plaquettaires, ainsi qu'en cas d'obstruction des voies biliaires. Déconseillé en cas d'hyperthyroïdie, de problèmes hépatiques, pancréatiques, de reflux gastro-œsophagien, de sensibilité gastro-intestinale, et chez les personnes avec antécédents d'épilepsie, de convulsions ou de pathologies neurologiques.