

BIOGAM Cu-Au-Ag
Koper-Goud-Zilver
Drinkbare oplossing - Perlinguale toediening

Biokatalytische oplossing bevat per dosis van 2ml: 63,6µg koper onder de vorm van kopergluconaat, 1,4µg goud onder de vorm van natrium aurothiomalaat, en 21,4µg zilver onder de vorm van zilverproteïnaat.

VERPAKKING

Glazen flesje met 60ml van de biokatalytische oplossing.
Zonder suiker, zonder bewaarmiddelen. Geschikt voor diabetici.

INGREDIËNTEN

Gezuiverd water, **stabilisatoren:** ethanol, glycerol (E422), **werkzame stoffen:** kopergluconaat, natriumaurothiomalaat, zilverproteïnaat.

WAT IS EEN BIOKATALYTISCHE OPLOSSING

Het is een oplossing die minerale elementen bevat die in staat zijn om de snelheid van chemische reacties te verhogen die noodzakelijk zijn voor het leven en voor de goede werking van het lichaam.

De biokatalysatoren:

- Brengen het algemene en cellulaire metabolisme opnieuw op gang (activatie van de synthese- en afbraakreacties van moleculen zoals koolhydraten, vetten en eiwitten).
- Behouden het evenwicht van de energie-uitwisselingen en de oxidatieprocessen van de celademhaling in balans.

Het is Dr. Jacques Ménétrier die als eerste de regels voor oligotherapie heeft opgesteld.

Hij heeft vier grote types diatheses onderscheiden, waaraan het “syndroom van misaanpassing” toegevoegd wordt. Dit laatste kan toegevoegd worden aan één van de diatheses of een patiënt oriënteren naar één van de vier pathologische diatheses ten gevolge van een bepaalde “agressie” (bijvoorbeeld lichamelijk, van microbiële of psychische aard).

De vier diatheses zijn : allergie, hyposthenie, dystonie en asthenie.

Een diathese wordt aan een zieke toegekend naargelang zijn erfelijke factoren, zijn vatbaarheid of weerstand voor ziekten en zijn lichamelijk, intellectueel en psychologisch gedrag.

De behandeling kan onmiddellijk gedefinieerd worden van zodra de goede diathese is gekozen.

- **Diathese : Asthenie**

De combinatie koper-goud-zilver is aangewezen om de diathese te wijzigen tijdens de herstelfase van infectie- en ontstekingsziekten (verkoudheid, griep, psoriasis, reuma) en in het bijzonder van depressie en asthenie.

Dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 2ml van biokatalytische oplossing 1 tot 2 maal per dag (perlinguale absorptie).
Kinderen jonger dan 10 jaar: 1ml, 1 tot 2 maal per dag.

Gebruik

Om een dosis te meten (1 dosis = 2ml): de spuit in de oplossing dompelen, de zuiger optrekken tot graduatie 2ml.

De oplossing kan puur of verdund in een beetje water worden gebruikt, bv. 15ml (soeplepel).

Houd één of twee minuten in de mond alvorens door te slikken.

Buiten de maaltijden innemen.

Het flesje na gebruik goed sluiten.

Bij voorkeur koel bewaren.

Bijwerkingen, toxiciteit

Bij de aanbevolen dosis, zijn er geen bijwerkingen of toxiciteit te vrezen.

Voorzorgen bij gebruik

Buiten het bereik en zicht van jonge kinderen houden. Neem niet meer dan de aanbevolen dosis.

Dit is geen voedingssupplement, noch een medicament maar een biokatalytische oplossing.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum aangegeven op de verpakking.

Alcohol vol 4%, hetzij 0,04ml alcohol per milliliter.

LABORATOIRES STEROP

Scheutlaan 46-50
1070 Brussel - België

Verst. : PHARMACOBEL

Biogam