

Bacilac ORS

L.rhamnosus GG - Bb lactis

Préparation de glucose et d'électrolytes pour réhydratation orale, avec des probiotiques.

Description

Bacilac ORS (Oral Rehydration Solution) est un produit alimentaire diététique destiné à des fins médicales, spécialement indiqué pour les besoins nutritionnels et la prévention de la déshydratation en cas de diarrhée.


En assurant une absorption optimale de l'eau et d'électrolytes, **Bacilac ORS** prévient et traite la déshydratation causée par une diarrhée aiguë. **Bacilac ORS** contient également des probiotiques pour une restauration optimale de la flore intestinale après un épisode de diarrhée.

Analyse :

Par sachet de 5,135 g		Par litre de solution
Na ⁺	0,415 g	1,66 g
K ⁺	0,2 g	0,8 g
Cl ⁻	0,57 g	2,28 g
Citrate ³⁻	0,47 g	1,84 g
<i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG	1,25 x 10 ⁹ CFU	
<i>Bifidobacterium lactis</i>	1,25 x 10 ⁹ CFU	

Mmol par litre	
Na ⁺	75 mmol/l
K ⁺	20 mmol/l
Cl ⁻	65 mmol/l
Citrate ³⁻	10 mmol/l
Glucose	75 mmol/l
Osmolarité totale	245 mmol/l

Mode de préparation



■ Dissoudre un sachet dans 250 ml d'eau à température ambiante (eau en bouteille à faible teneur en minéraux ou l'eau du robinet préalablement bouillie).

■ Suivre les conseils donnés par le médecin et/ou pharmacien.

■ La solution ORS bien fermée peut être conservée dans le réfrigérateur pendant au maximum 24 heures.

Réchauffer la solution ORS jusqu'à température ambiante avant consommation.

Ne jamais dissoudre de la poudre ORS dans d'autres boissons ou de la nourriture ce qui rendrait le produit inefficace.

Mode d'emploi

■ Adultes

Prenez jusqu'à 8 à 10 sachets par jour. Quand la diarrhée et les symptômes de déshydratation sont manifestement améliorés, vous pouvez diminuer progressivement la prise de **Bacilac ORS** pendant les jours suivants.

■ Enfants

Premier jour, dissoudre et faire boire 15 – 20 ml de solution par kg de poids corporel par heure jusqu'à un maximum de 4 à 6 sachets répartis dans la journée.

Si la diarrhée et les symptômes de déshydratation sont manifestement améliorés, vous pouvez diminuer progressivement pendant les jours suivants la prise de **Bacilac ORS**.

Pour les très jeunes enfants, demander conseil à votre médecin.

Composition

Glucose anhydrate, Trisodium citrate dihydrate, Sodium chloride, *Lactobacillus rhamnosus* GG, *Bifidobacterium lactis*, Potassium chloride.

Précautions

Ne pas administrer en cas de vomissement sans diarrhée.

Bacilac ORS n'est pas adapté comme seule source d'alimentation.

Lire attentivement le mode d'emploi avant usage.

Le produit doit être utilisé sous contrôle médical.

VÉSALE PHARMA
Microbiotic Solutions

Rue Louis Allaert, 9
5310 Noville-Mehaigne
Belgium
www.vesalepharma.com

MADE IN BELGIUM

B ORS-BE-LI-03.18-V01

Bacilac ORS

L.rhamnosus GG - Bb lactis

Glucose – electrolyten preparaat voor orale rehydratatie, met probiotica.

Beschrijving

Bacilac ORS (Oral Rehydration Solution) is een dieetvoeding voor medisch gebruik voor specifieke voedingsbehoeften ter voorkoming van uitdroging bij diarree. Door het verzekeren van een optimale water- en zelektrolytenabsorptie, voorkomt en behandelt **Bacilac ORS** deshydratatie bij acute diarree.


Bacilac ORS bevat eveneens probiotica die zorgen voor een optimaal herstel van de flora na een diarree episode.

Analyse :

Per zakje van 5,135 g		Per liter oplossing
Na ⁺	0,415 g	1,66 g
K ⁺	0,2 g	0,8 g
Cl ⁻	0,57 g	2,28 g
Citraat 3-	0,47 g	1,84 g
<i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG	1,25 x 10 ⁹ CFU	
<i>Bifidobacterium lactis</i>	1,25 x 10 ⁹ CFU	

Mmol per liter	
Na ⁺	75 mmol/l
K ⁺	20 mmol/l
Cl ⁻	65 mmol/l
Citraat 3-	10 mmol/l
Glucose	75 mmol/l
Totale osmolariteit	245 mmol/l

Bereidingwijze



■ Eén zakje ORS oplossen in 250 ml water op kamertemperatuur (mineraalarm flessenwater of vooraf gekookt leidingwater).

■ Volg de aanwijzingen van uw arts en/of apotheker.

■ De ORS oplossing mag afgedekt in de koelkast bewaard worden gedurende maximaal 24 u.

De nodige hoeveelheid ORS oplossing opwarmen tot kamertemperatuur (+/-25°C).

Nooit ORS oplossen in zuigelingenvoeding, vaste voeding of dranken.

Dit maakt het product onwerkzaam.

Gebruiksaanwijzing

■ Bij volwassenen

Neem per dag 8 tot 10 zakjes.

Als de diarree en de uitdrogingsverschijnselen aanzienlijk verbeterd zijn, kan men de volgende dagen de toediening van **Bacilac ORS** afbouwen.

■ Bij kinderen

De eerste dag 15 – 20 ml oplossing per kg lichaamsgewicht per uur tot maximaal 4 tot 6 zakjes **Bacilac ORS**, over de dag verdeeld, oplossen en opdrinken.

Als de diarree en de uitdrogingsverschijnselen aanzienlijk verbeterd zijn, kan men de volgende dagen de toediening van **Bacilac ORS** afbouwen.

Bij jonge kinderen, raadpleeg uw arts en volg zijn voorschrift.

Samenstelling

Glucose anhydraat, Trinitriumcitraat dihydraat, Natrium chloride, *Lactobacillus rhamnosus* GG, *Bifidobacterium lactis*, Kaliumchloride.

Waarschuwing

Niet toedienen bij braken zonder diarree.

Bacilac ORS is niet geschikt om als enige voeding te nemen.

Lees goed de gebruiksaanwijzing voor inname.

Bacilac ORS moet onder medisch toezicht gebruikt worden.

VÉSALE PHARMA
Microbiotic Solutions

Rue Louis Allaert, 9
5310 Noville-Mehaigne
Belgium
www.vesalepharma.com

MADE IN BELGIUM

B ORS-BE-LI-03.18-V01