



# Reductin

Cellulite - Cellulitis

Dyna+ SARL  
16A, av. de la Liberté  
1930 Luxembourg  
www.reductin.lu

Analyse nutritionnelle  
Voedingsanalyse

Pour 1 comprimé  
Voor 1 tablet

Par 100 gr  
Per 100 gr

Kcal	1,56	19
KJ	6,6	81
Glucides / Koolhydraten	0,66 g	8,05 g
Protides / Eiwitten	0,2 g	1,2 g
Lipides / Lipiden	Traces	0,3 g

Poids net:  
Netto gewicht:90g

## Complément alimentaire

\*Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (24 mg/portion journalière)  
Bevat cafeïne, niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen (24 mg/dagelijkse dosis)

INGRÉDIENTS INGREDIËNTEN	1 comprimé 1 tablet	Pour 100 gr Voor 100 gr
Phosphate dicalcique Dicalcium fosfaat	140,05 mg	15,72 g
Cellulose microcristalline Microkristalline cellulose	123 mg	13,8 g
Bourrache GLA encapsulé Ingekapseld GLA borage	121,95 mg	13,68 g
Extrait de Reine des prés Moerasspirea-extract	100 mg	11,22 g
Extrait de Curcuma Meriva Kurkuma Meriva extract	100 mg	11,22 g
Extrait de Bardane Bardaanextract	50 mg	5,61 g
Extrait de Guarana* (12% caféine) Guarana-extract*	50 mg	5,61 g
Extrait de Marron d'Inde Paardekastanje-extract	50 mg	5,61 g
Extrait de Fragon Muizedoomextract	50 mg	5,61 g
Extrait d'Orthosiphon Orthosiphonextract	50 mg	5,61 g
SOD Dismutase SOD dismutase	20 mg	2,24 g
Stéarate de magnésium Magnesium stearaat	16 mg	1,8 g

**REDUCTIN® Cellulite** contient une formulation brevetée.

**Conseil d'utilisation:**  
2 à 4 comprimés/jour, en 2 prises.

**Mode d'emploi:**  
Voie orale. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée sans avis médical. Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée, et à un mode de vie sain. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

**REDUCTIN® CELLULITIS** bevat een gepatenteerde formule.

**Gebruiksadvies:**  
2 tot 4 tabletten per dag, in twee innamen.

**Gebruiksaanwijzing:**  
Oraal gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden zonder doktersadvies. Vervangt geen gevarieerde en evenwichtige voeding, noch een gezonde levensstijl. Raadpleeg uw arts op apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.